

Теория Меры 4: Теорема Радона-Никоудима и теорема Фубини

4.1. Разложение Хана

Определение 4.1. Напомним, что **зарядом** называется счетно-аддитивная функция на σ -алгебре, принимающая значения в \mathbb{R} .

Задача 4.1 (!). Пусть ρ - заряд на сигма-алгебре $\mathfrak{A} \subset 2^S$, а $\beta := \inf \rho(B_\alpha)$, где \inf берется по всем B_α таким, что $\rho(B_\alpha) < 0$.

а. Докажите, что $\beta > -\infty$.

б. Пусть E измеримое множество, такое, что $\rho(E) \leq \beta + \epsilon$. Докажите, что для любого $E' \subset S \setminus E$, $\rho(E') \geq -\epsilon$.

в. Пусть E_1, E_2 измеримые множества, причем $\rho(E_i) \leq \beta + \epsilon_i$. Докажите, что $\rho(E_1 \Delta E_2) \geq -\epsilon_1 - \epsilon_2$. Выведите из этого, что $\rho(E_1 \cup E_2) \leq \beta + \epsilon_1 + \epsilon_2$ и $\rho(E_1 \cap E_2) \leq \beta + \epsilon_1 + \epsilon_2$.

г. Пусть E_i - последовательность измеримых множеств, такая, что $\rho(E_i) \leq \beta + \frac{1}{2^i}$. Докажите, что последовательность $B_j := \cup_{i>j} E_j$ обладает тем же свойством.

д. В этих условиях, покажите, что $\rho(B) = \beta$, где $B = \bigcap B_i$.

Задача 4.2. В условиях предыдущей задачи, обозначим $S \setminus B$ за A . Докажите, что $\rho(V) \geq 0$ для любого измеримого $V \subset A$.

Определение 4.2. В этой ситуации говорится, что заряд ρ **положителен на** A , обозначается $\rho \geq 0$. Ясно, что в таком случае $\rho|_A$ является мерой. Если $-\rho$ положителен, говорится, что ρ отрицателен. Если же $\rho(V) = 0$ для любого измеримого $V \subset A$, говорится, что множество A **ρ -пренебрежимо**.

Задача 4.3 (!). В условиях Задачи ??, докажите, что ρ отрицателен на B , положителен на $A := S \setminus B$, и разложение $S = A \amalg B$ определено однозначно с точностью до ρ -пренебрежимого множества.

Определение 4.3. Это разложение называется **разложением Хана**.

Задача 4.4. Обозначим за ρ^+ меру $V \rightarrow \rho(V \cap A)$ и за ρ^- меру $V \rightarrow -\rho(V \cap B)$. Докажите, что $\rho = \rho^+ - \rho^-$. Докажите, что такое разложение единственно для любого заряда ρ , в предположении, что $\rho^+ = 0$ на некотором множестве B_1 , $\rho^- = 0$ на некотором множестве A_1 , и $A_1 \cup B_1 = S$.

Определение 4.4. Это разложение называется **разложением Жордана**.

Задача 4.5. Пусть f интегрируемая функция на пространстве с мерой μ . Докажите, что $\rho(A) := \int_A f \mu$ это заряд. Напишите разложение Жордана и разложение Хана для меры ρ .

4.2. Абсолютная непрерывность

Определение 4.5. Пусть S - пространство с сигма-алгеброй, а μ и ν две меры. Мы говорим, что ν **абсолютно непрерывна** относительно μ (обозначается $\nu \ll \mu$) если для любого измеримого множества A , из $\mu(A) = 0$ следует $\nu(A) = 0$.

Замечание. Алгебру измеримых (по Лебегу) множеств на \mathbb{R}^n мы предполагаем фиксированной. Когда говорится о мере на \mathbb{R}^n , всегда речь идет о мере на этой алгебре.

Задача 4.6. Приведите пример меры на \mathbb{R}^n , не равномерно непрерывной относительно меры Лебега

Задача 4.7. Найдите бесконечный набор M мер на \mathbb{R}^n , таких, что никакая мера $\mu \in M$ не равномерно непрерывна относительно другой $\mu' \in M$.

Задача 4.8 ().** Найдите такой набор мощности больше континуума.

Задача 4.9. Пусть μ мера на пространстве с сигма-алгеброй, а f - интегрируемая функция со значениями в $\mathbb{R}^{\geq 0}$. Определим меру $f\mu$ как $A \rightarrow \int_A f\mu$. Докажите, что $f\mu \ll \mu$.

Задача 4.10 (!). Пусть на пространстве S с сигма-алгеброй заданы меры $\nu \ll \mu$, причем $\nu(S) < \infty$. Докажите, что для любого $\delta > 0$ найдется $\epsilon > 0$ такой, что из $\mu(V) < \epsilon$ вытекает $\nu(V) < \delta$.

Замечание. Довольно часто это свойство предлагается в качестве определения абсолютной непрерывности.

Задача 4.11 (*). Найдите контрпример к утверждению предыдущей задачи, в ситуации, когда $\nu(S) = \infty$.

Задача 4.12. В условиях задачи ??, предположим, что $\mu(S) < \infty$ и $\nu(S) > 0$. Рассмотрим заряд $\nu - \epsilon\mu$, где $\epsilon > 0$, и пусть $S = A_\epsilon \amalg B_\epsilon$ соответствующее ему разложение Хана.

а. Докажите, что $\nu(B_\epsilon) \leq \epsilon\mu(S)$, и $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \nu(B_\epsilon) = 0$.

б. Выведите из этого, что $\nu(A_\epsilon) > \frac{1}{2}\nu(S)$ для достаточно маленьких ϵ .

в. Докажите, что $\mu(A_\epsilon) > 0$ для какого-то ϵ

Задача 4.13 (!). Пусть на пространстве S с сигма-алгеброй заданы меры $\nu \ll \mu$, причем $0 < \nu(S) < \infty$ и $\mu(S) < \infty$. Докажите, что для какого-то измеримого множества A с $\mu(A) > 0$, и какого-то $\epsilon > 0$ заряд $\nu - \epsilon\mu$ положителен на A .

Указание. Воспользуйтесь предыдущей задачей

Задача 4.14 (!). Приведите контрпример к утверждению задачи ??, где μ мера Лебега на единичном кубе $S \subset \mathbb{R}^n$, а ν не обязательно удовлетворяет $\nu \ll \mu$.

Задача 4.15. Пусть на пространстве S с с сигма-алгеброй заданы меры $\nu \ll \mu$, причем $\mu(S) < \infty$ и $\nu(S) < \infty$. Рассмотрим множество \mathcal{F} интегрируемых функций $f : S \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$ таких, что $\int_E f\mu \leq \nu(E)$ для любого измеримого множества $E \subset S$. Пусть α есть супремум $\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_S f\mu$. Докажите, что $\alpha = \int_S \nu$, и этот супремум реализуется для измеримой функции $f \in \mathcal{F}$.

Указание. Рассмотрим последовательность $\{f_i\} \in \mathcal{F}$ таких, что

$$\lim_i \int_S f_i \mu = \alpha.$$

Докажите, что $f := \sup f_i$ это измеримая функция, лежащая в \mathcal{F} и удовлетворяющая $\alpha = \int_S f \mu$. Воспользовавшись задачей ??, найдите A , $\mu(A) > 0$ и ϵ такие, что $\nu' > \epsilon \mu$ на A , где $\nu' := \nu - f \mu$. Функция $f' := f + \epsilon \chi_A$ принадлежит \mathcal{F} и удовлетворяет $\int_S f' > \int_S f$.

Замечание. На протяжении этого листка полезно пользоваться следующей леммой. Пусть $\{f_i\}$ - монотонно убывающая или возрастающая последовательность интегрируемых функций, ограниченная по норме $|\cdot|_1$. Тогда $\{f_i\}$ это последовательность Коши в смысле L_1 -топологии, (топологии, заданной нормой $|\cdot|_1$), и сходится (в смысле L_1 -топологии) к поточечному пределу f_i . Докажите ее.

Задача 4.16 (!). (теорема Радона-Никодима) Пусть на пространстве S с сигма-алгеброй заданы меры $\nu \ll \mu$, причем $\mu(S) < \infty$ и $\nu(S) < \infty$. Докажите, что существует интегрируемая функция $f : S \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$ такая, что $\nu = f \mu$.

Указание. Воспользовавшись предыдущей задачей, найдите измеримую функцию $f \in \mathcal{F}$ такую, что $\int_S f \mu = \nu(S)$. Выведите из этого, что $\int_E f \mu = \nu(E)$ для любого измеримого множества E .

Задача 4.17 (*). Определите абсолютную непрерывность для зарядов. Сформулируйте и докажите теорему Радона-Никодима в такой ситуации.

4.3. Прямой образ меры

Определение 4.6. Пусть M, N пространства с заданными на них сигма-алгебрами \mathcal{U}_M и \mathcal{U}_N , а $f : M \rightarrow N$ - измеримое отображение. Определим **прямой образ меры** $f_* \mu : \mathcal{U}_N \rightarrow \mathbb{R}$ посредством

$$f_* \mu(Z) := \mu(f^{-1}(Z)).$$

Задача 4.18. Докажите, что это определение задает меру на N .

Задача 4.19 (!). Рассмотрим измеримую функцию $f : I \rightarrow I$, и пусть $\pi : I \times I \rightarrow I$ проекция на первый множитель. Рассмотрим $K \subset I \times I$ состоящий из всех

$$\{x, y \in I \times I \mid f(x) \geq y\}.$$

K следует рассматривать как область под графиком f в $I \times I$. В предположении, что мера произведения на $I \times I$ σ -аддитивна, докажите, что K измеримо, а $\pi_* \mu = f \mu$, где μ это мера Лебега.

Определение 4.7. Пусть M, N топологические пространства, \mathcal{U}_M и \mathcal{U}_N алгебры борелевских множеств, а $f : M \rightarrow N$ - непрерывное отображение. Пусть на M задана мера μ . Определим **прямой образ меры** $f_* \mu : \mathcal{U}_N \rightarrow \mathbb{R}$ так:

$$f_* \mu(Z) := \mu(f^{-1}(Z)).$$

Прямой образ меры Лебега при непрерывном отображении компактных подмножеств из \mathbb{R}^n продолжается до меры на алгебре измеримых множеств. Полученная мера называется **прямым образом меры Лебега**.

Задача 4.20. Приведите пример непрерывного отображения $f : M \rightarrow N$ открытых подмножеств \mathbb{R}^n такого, что прямой образ меры Лебега не абсолютно непрерывен по отношению к мере Лебега на N .

Задача 4.21 (!). Пусть $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ невырожденный линейный оператор. Докажите, что $L_*\mu = |\det L|\mu$.

Задача 4.22 (*). Пусть $\phi : [0, 1] \rightarrow [0, 1] \times [0, 1]$ - отображение Пеано (непрерывное сюръективное отображение из отрезка в квадрат, построенное в листке Геометрия 8). Докажите, что $\phi_*\mu = \mu$, где μ это мера Лебега.

Задача 4.23 (*). Пусть $(A, \mu_A), (B, \mu_B)$ пространства с мерой, а $\phi : A \rightarrow B, \psi : B \rightarrow A$ инъективные измеримые отображения, которые удовлетворяют $\psi_*\mu_B = \mu_A, \phi_*\mu_A = \mu_B$. Предположим, что образ ψ и ϕ также измерим, и обратные отображения (определенные на образе) измеримы. Докажите, что есть биекция $\xi : A \rightarrow B$, которая удовлетворяет $\xi_*\mu_A = \mu_B$.

Задача 4.24 (*). Пусть $(A, \mu_A), (B, \mu_B)$ - единичные кубы в \mathbb{R}^n и в \mathbb{R}^m , с мерой Лебега. Постройте измеримую биекцию $\xi : A \rightarrow B$, которая удовлетворяет $\xi_*\mu_A = \mu_B, \xi_*^{-1}\mu_B = \mu_A$.

4.4. Теорема Фубини

Определение 4.8. Пусть (X, μ_X) и (Y, μ_Y) пространства с σ -алгеброй и счетно-аддитивной мерой. Напомним, что цилиндрическим множеством называется подмножество вида $A \times B \subset X \times Y$, где A и B измеримы в X, Y . Рассмотрим алгебру, порожденную цилиндрическими подмножествами в $X \times Y$, и положим $\mu(A \times B) := \mu_X(A)\mu_Y(B)$. Пусть $L(X \times Y)$ - пополнение этой алгебры, по внешней мере μ^* , связанной с μ , определенное в листке 2.

Задача 4.25. В этих условиях, обозначим за $\pi : X \times Y \rightarrow Y$ естественную проекцию. Рассмотрим измеримое подмножество $A \subset X \times Y$, и пусть $\pi_*\mu_A := \pi_*(\chi_A\mu^*)$ прямой образ меры с A . Предположим, что X является счетным объединением подмножеств конечной меры (такие пространства называются σ -конечными). Докажите, что $\pi_*\mu_A$ абсолютно непрерывно относительно μ_Y : $\pi_*\mu_A \ll \mu_Y$

Замечание. Согласно теореме Радона-Никоидима, $\pi_*\mu_A = f_A\mu_Y$, для какой-то измеримой функции f_A на Y .

Задача 4.26. Пусть $A \subset X \times Y$ - цилиндрическое измеримое множество, представленное в виде счетного объединения цилиндрических: $A = \coprod A_i$. Докажите, что $\pi_*(\chi_A\mu) = \sum \pi_*(\chi_{A_i}\mu)$. Выведите из этого, что мера μ на $X \times Y$ σ -аддитивна.

Замечание. Из этого следует, например, что мера Лебега от единичного куба равна 1. Доселе мы не могли этого утверждать.

Задача 4.27. Пусть $A \subset X \times Y$ множество меры нуль. Докажите, что $f_A = 0$, где f_A - функция, определенная выше

Указание. Воспользуйтесь тем, что $\int_Y f_A\mu_Y = \int_A \mu^* = 0$.

Задача 4.28. Пусть задана последовательность Коши измеримых множеств $A_i \subset X \times Y$, сходящаяся к $A \subset X \times Y$, а f_{A_i}, f_A - функции на Y , построенные выше. Докажите, что f_{A_i} сходятся к f_A в метрике, заданной $|\cdot|_1$.

Указание. Если $\mu(B) = \epsilon$, то $\int_Y f_B \mu_Y = \epsilon$.

Определение 4.9. Пусть $A \subset X \times Y$ измеримо. Рассмотрим функцию f_A на Y (Замечание ??). Подмножество $A \subset X \times Y$ называется π -измеримым, если $A_y := A \cap \pi^{-1}(y) \subset X \times \{y\}$ измеримо для почти всех $y \in Y$ (т.е. вне множества меры нуль на Y), и $\mu_X(A_y) = f_A(y)$ почти везде.

Задача 4.29 (!). Докажите, что цилиндрические множества π -измеримы. Докажите, что конечные объединения и пересечения π -измеримых множеств π -измеримы. Докажите, что множества меры нуль π -измеримы.

Определение 4.10. Последовательность подмножеств $\{A_i\} \subset S$ называется **монотонной**, если $A_i \subset A_j$ для всех $j > i$, либо $A_i \supset A_j$ для всех $j > i$. В первом случае говорится, что $\{A_i\}$ возрастающая последовательность, во втором случае - убывающая.

Задача 4.30. а. Пусть задана монотонная последовательность $A_i \subset X \times Y$ π -измеримых множеств. Докажите, что функция $y \rightarrow \mu_X(A_{iy})$ сходится к $y \rightarrow \mu_X(A_y)$, где $A = \bigcup A_i$ для возрастающей последовательности и $A = \bigcap A_i$ для убывающей последовательности.

б. Выведите из этого, что монотонная последовательность Коши π -измеримых множеств сходится к π -измеримому множеству

Задача 4.31 (!). Докажите, что все измеримые подмножества в $X \times Y$ π -измеримы.

Указание. Докажите, что любое измеримое множество, с точностью до множества меры нуль, приближается последовательностью Коши вида $\bigcup_j \bigcap_{i>j} A_i$, где все A_i - конечные объединения цилиндрических. Выведите из этого, что любое измеримое подмножество (с точностью до множества меры нуль) получается посредством монотонных пределов из π -измеримых множеств.

Задача 4.32 (*). Пусть I есть единичный интервал, а $\phi : I \rightarrow I^n$ отображает число x с десятичной записью $0, a_1 a_2, \dots$ в (x_1, \dots, x_n) , где x_i записывается в десятичном виде как $0, a_i a_{i+n} a_{i+2n} \dots$. Обозначим за μ_I меру Лебега на I^n . Докажите, что $\phi_* \mu_I$ есть мера Лебега на кубе I^n

Задача 4.33 (!). (теорема Фубини) Пусть ϕ интегрируемая функция на $X \times Y$, с мерой, заданной выше. Для $y \in Y$, рассмотрим ограничение ϕ на $X \times \{y\}$ как функцию $\phi_y : X \rightarrow \mathbb{R}$. Докажите, что ϕ_y измеримо для почти всех $y \in Y$, и

$$\int_{X \times Y} f \mu = \int_Y \left(\int_X \phi_y \mu_X \right) \mu_Y.$$

Задача 4.34 (*). Приведите пример неизмеримой функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, график которой измерим.

Задача 4.35 ().** Существует ли функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, график которой неизмерим?